

Léčba nádorů močového měchýře neprorůstajících do svaloviny



# TUR A NĚCO NAVÍC

Bezprostřední instilace Mitomycinu C u každého pacienta po TUR <sup>1</sup>

- ▶ Klíčová složka doporučení EAU pro adjuvantní léčbu <sup>1</sup>
- ▶ Dokázáno, že proti TUR samotné významně omezuje recidivu nádoru <sup>2</sup>
- ▶ Účinnost maximalizuje léčba do 24 hodin od operace <sup>3</sup>

Opakované dávky Mitomycinu C jsou účinnou a dobře snášenou volbou pro pacienty se středním rizikem <sup>4,5</sup>



**Literatura:** 1. Babjuk M et al. European Association of Urology. Guidelines on TaT1 (Non-muscle invasive) Bladder Cancer. Available from: <http://www.uroweb.org/nc/professional-resources/guidelines/online/> 2. Sylvestr RJ et al. *J Urol* 2004; **171**: 2186-90. 3. Kaasinen E et al. *J Urol* 2002; **42**: 167-74. 4. Friedrich MG et al. *Eur Urol* 2007; **52**: 1123-30. 5. Malmström P-U et al. *Eur Urol* 2009; **56**: 247-56.

Materiál je určen výhradně odborníkům dle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., tj. osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky.

Zkrácená informace o přípravku je uvedena na straně xy

